術後補助

| レジメン名 | 期間 | 投与方法 | 投与日 | 薬剤名（一般名） | 投与量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CapeOX療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| DS療法(1～7コース)<br>※ドセタキセルは2コース目から開始 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ドセタキセル | 40mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |
| DS療法(8コース以降) | 42日 | 内服 | 1～28 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |

進行再発

| レジメン名 | 期間 | 投与方法 | 投与日 | 薬剤名（一般名） | 投与量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capecitabine+CDDP（XP）療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | シスプラチン | 80mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| S-1＋CDDP（SPIRIT）療法 | 35日 | 内服 | 1～21 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |
| | | 点滴静注 | 8 | シスプラチン | 60mg/㎡ |
| wPAC療法 | 28日 | 点滴静注 | 1・8・15 | パクリタキセル | 80mg/㎡ |
| CapeOX療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| G-SOX療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 100mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |
| XP+Trastuzumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | トラスツマブ | 初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1 | シスプラチン | 80mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| CapeOX+Trastuzumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | トラスツマブ | 初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| SOX+Trastuzumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | トラスツマブ | 初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |
| mFOLFOX6療法 | 14日 | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 85mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1 | レボホリナート | 200mg/㎡ |
| | | 急速静注 | 1 | 5-フルオロウラシル | 400mg/㎡ |
| | | 持続静注 | 1 | 5-フルオロウラシル | 2400mg/㎡（46時間） |
| DOC療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ドセタキセル | 60mg/㎡ |
| Nivolumab療法 | 14日 | 点滴静注 | 1 | ニボルマブ | 240mg |
| Nivolumab療法 | 28日 | 点滴静注 | 1 | ニボルマブ | 480mg |
| SOX+Nivolumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ニボルマブ | 240mg |
| | | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム | 40mg/㎡/回　1日2回 |
| CapeOX+Nivolumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ニボルマブ | 240mg |
| | | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| RAM+PAC | 28日 | 点滴静注 | 1・15 | ラムシルマブ | 8mg/kg |
| | | 点滴静注 | 1・8・15 | パクリタキセル | 80mg/㎡ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CapeOX+Trastuzumab＋Pembrolizumab療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | ペムブロリズマブ | 200mg/body |
| | | 点滴静注 | 1 | オキサリプラチン | 130mg/㎡ |
| | | 点滴静注 | 1 | トラスツマブ | 初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg |
| | | 内服 | 1～14 | カペシタビン | 1000mg/㎡/回　1日2回 |
| T-Dxd療法 | 21日 | 点滴静注 | 1 | トラスツズマブ　デルクステカン | 6.4mg/kg |