周術期

Pembrolizumab+CBDCA+PAC療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
		点滴静注	1・8・15	パクリタキセル	80mg/㎡
		点滴静注	1・8・15	カルボプラチン	AUC1.5
Pembrolizumab+EC療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
		点滴静注	1・8・15	エピルビシン	90mg/㎡
		点滴静注	1・8・15	シクロホスファミド	600mg/㎡
Pembrolizumab+AC療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body
		点滴静注	1・8・15	ドキソルビシン	60mg/㎡
		点滴静注	1・8・15	シクロホスファミド	600mg/㎡
Pembrolizumab(維持)療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	200mg/body

術後補助

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量
ddAC療法	14日	点滴静注	1	ドキソルビシン	60mg/㎡
		点滴静注	1	エンドキサン	600mg/㎡
		皮下注射	24～72時間以内	ペグフィルグラスチム	3.6mg
TC療法	21日	点滴静注	1	ドセタキセル	75mg/㎡
		点滴静注	1	エンドキサン	600mg/㎡
Pertuzumab+Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回:840mg 2回目以降:420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg
weekly PAC療法	7日	点滴静注	1	パクリタキセル	80mg/㎡
weeklyPAC+Pertuzumab+Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回:840mg 2回目以降:420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg
		点滴静注	1・8・15	パクリタキセル	80mg/㎡
weeklyPAC+Trastuzumab療法	7日	点滴静注	1	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg
		点滴静注	1	パクリタキセル	80mg/㎡
triweekly Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg
T-DM1療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg
TCH+P療法	21日	点滴静注	1	ドセタキセル	75mg/㎡
		点滴静注	1	カルボプラチン	AUC6
		点滴静注	1	ベバシズマブ	15mg/kg
		点滴静注	1	ペルツズマブ	初回:840mg 2回目以降:420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg

進行再発

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量
weekly PAC療法	28日	点滴静注	1・8・15	パクリタキセル	80mg/㎡
weekly PAC＋Trastuzumab 療法	28日	点滴静注	1・8・15・22	トラスツズマブ	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg
		点滴静注	1・8・15	パクリタキセル	80mg/㎡
wPAC+Bevacizumab療法	28日	点滴静注	1・8・15	パクリタキセル	90mg/㎡
		点滴静注	1・15	ベバシズマブ	10mg/kg

weekly Trastuzumab療法	7日	点滴静注	1	トラスツズマブ	初回：4mg/kg　2回目以降：2mg/kg
triweekly Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ	初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg
Atezolizumab+nabPAC療法	28日	点滴静注	1・15	アテゾリブマブ	840mg
		点滴静注	1・8・15	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg/㎡
Pertuzumab+Trastuzumab+DOC療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回：840mg　2回目以降：420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg
		点滴静注	1	ドセタキセル	75mg/㎡
Pertuzumab+Trastuzumab療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回：840mg　2回目以降：420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ	初回：8mg/kg　2回目以降：6mg/kg
T-DM1療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ　エムタンシン	3.6mg/kg
Eribulin 療法	21日	点滴静注	1・8	エリブリン	1.4mg/㎡
VNB療法	21日	点滴静注	1・8	ビノレルビン	25mg/㎡
VNB+Tra療法	21日	点滴静注	1・8	ビノレルビン	25mg/㎡
		点滴静注	1・8・15	トラスツズマブ	初回：4mg/kg　2回目以降：2mg/kg
T-Dxd療法	21日	点滴静注	1	トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg
Dato-Dxd療法	21日	点滴静注	1	ダトポタマブ　デルクステカン	6mg/kg
Sacituzumab govitecan療法	21日	点滴静注	1・8	サシツズマブ　ゴビテカン	10mg/kg
Pembrolizumab+GEM+CBDCA療法	21日	点滴静注	1	ペムブロリズマブ	240mg/body
		点滴静注	1・8	ゲムシタビン	1000mg/㎡
		点滴静注	1・8	カルボプラチン	AUC2
Pembrolizumab+PAC療法	84日	点滴静注	1・8・15・29・36・43・57・64・71	パクリタキセル	90mg/㎡
		点滴静注	1・43	ペムブロリズマブ	400mg/body
Pembrolizumab+nabPAC療法	84日	点滴静注	1・8・15・29・36・43・57・64・71	ナブパクリタキセル	100mg/㎡
		点滴静注	1・43	ペムブロリズマブ	400mg/body
T-Dxd+Pertuzumab療法	21日	点滴静注	1	ペルツズマブ	初回：840mg　2回目以降：420mg
		点滴静注	1	トラスツズマブ　デルクステカン	5.4mg/kg